

Флоролакт®

Пребиотический комплекс

Биологически активная добавка к пище на основе растворимых пищевых волокон и лактитола

Состав:

Содержимое одного пакетика-саше Флоролакта (5 г):

- Обогащающая добавка «Флорация» (гуммиарабик, фруктоолигосахариды) – 3,33 г
- Лактитол (лактит МС) – 1,67 г

Область применения:

Флоролакт рекомендуется в качестве дополнительного источника растворимых пищевых волокон и лактитола, а также в качестве пребиотика комплексного действия для восстановления микрофлоры и нормализации моторики кишечника.

Гуммиарабик (полисахариды акации) и фруктоолигосахариды (инулин) являются природными, полностью растворимыми пищевыми волокнами, которые в неизменном виде достигают толстой кишки, где стимулируют рост полезных бифидо- и лактобактерий. Лактитол (лактит) относится к группе неперевариваемых дисахаридов, которые действуют только в толстой кишке, и по своим эффектам эквивалентен растворимым природным пищевым волокнам.

Гуммиарабик, фруктоолигосахариды и лактитол оказывают пребиотическое действие, расщепляясь полезными бактериями толстой кишки до короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), таких как масляная (бутират) и пропионовая (пропионат). КЦЖК в норме участвуют в регуляции моторной функции толстой кишки и ответственны за поддержание функционального состояния ее слизистой оболочки. Масляная кислота (бутират) является одним из основных источников энергообеспечения кишечного эпителия (колоноцитов), оказывая также противовоспалительное и антипролиферативное действие. Пропионовая кислота регулирует микроциркуляцию в слизистой оболочке кишечника, обладает противомикробным действием и участвует в процессах глюконеогенеза и синтезе биогенных аминов в печени. Кроме того, рост полезных бактерий приводит к связыванию и выведению аммиака из толстой кишки (гипоаммониемический эффект), а также к снижению уровня холестерина в крови (гипохолестеринемический эффект).

Сочетание во Флоролакте трех видов полисахаридов с разной длиной цепи обеспечивает комплексное пребиотическое, мукопротективное (защищающее слизистую оболочку кишечника) и нормализующее моторику действие Флоролакта на всем протяжении толстой кишки, начиная с проксимальных и заканчивая дистальными ее отделами: лактитол быстро расщепляется в проксимальных отделах восходящей ободочной кишки, фруктоолигосахариды быстро ферментируются и используются в основном в восходящей ободочной и частично в поперечной ободочной кишке, а полисахариды из акации (гуммиарабик) расщепляются медленнее и используются далее в поперечной ободочной и нисходящей ободочной кишке.

Комбинация фруктоолигосахаридов с гуммиарабиком обладает более выраженным, синергическим пребиотическим эффектом по сравнению с отдельным применением фруктоолигосахаридов или гуммиарабика и достоверно улучшает переносимость фруктоолигосахаридов, существенно снижая такие явления, как метеоризм, вздутие живота, дискомфорт.

Добавление пребиотиков, содержащих ди-, олиго- и полисахариды (фруктоолигосахариды [ФОС], гуммиарабик, лактитол), к стандартной антихеликобактерной терапии в стандартных дозах в течение одного месяца улучшает переносимость терапии, повышает эффективность эрадикации *Helicobacter pylori* и комплайенс (VI Национальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и ассоциированных с *Helicobacter pylori* заболеваний – VI Московские соглашения, 2016).

Рекомендации по применению:

Для профилактики нарушений деятельности кишечника и для восстановления микрофлоры толстой кишки (при дисбактериозе), для нормализации метаболизма взрослым и детям старше 14 лет:

- 5,0 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза в день во время еды в течение месяца.


При необходимости прием можно повторить

Для нормализации стула при запоре взрослым и детям старше 14 лет:

- Начальная доза: 5–10 г Флоролакта (1–2 пакетика-саше) в день, при необходимости возможно увеличение дозы до 15–20 г (3–4 пакетика-саше) в день до нормализации стула
- Далее – переход на пребиотическую дозу:

5 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза в день в течение месяца

Разовую дозу – 5 г порошка (содержимое одного пакетика-саше) перед употреблением необходимо растворить в 50–100 мл воды комнатной температуры.



Содержание растворимых пищевых волокон в суточной дозе продукта (напиток из 5–10 г) составляет не менее 1,5–3 г, что соответствует 75–150% адекватного уровня суточного потребления, но не превышает верхний допустимый уровень.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Условия хранения:

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше +25° С.

Срок годности: 2 года со дня изготовления.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Флоролакт не содержит лактозу, казеин и глютен.

Более подробную информацию о Флоролакте можно получить на сайте www.florolact.ru

Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.99.88.003.E.005270.04.15 от 03.04.2015 г.

ТУ 9197-001-89122859-11 с изм. № 1

Предприятие-изготовитель:

ООО «Витамер», Российская Федерация, 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 1, пом. III (адрес производства: Владимирская область, г. Петушки, ул. Совхозная, д. 11).

Владелец прав на препарат, организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя:

ООО «Аванетик», 197110, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 30, лит. В, пом. 202.

Тел.: +7 (812) 644 53 44, e-mail: avanetik@mail.ru, info@florolact.ru

Веб-сайт: www.florolact.ru