


## Пребиотический комплекс «Флоролакт®»: профилактика антибиотик-ассоциированной диареи и дисбиоза

- В условиях антихеликобактерной терапии высокими дозами антибиотиков Флоролакт статистически достоверно снижал\*:
- число случаев антибиотик-ассоциированной диареи;
  - частоту антибиотик-ассоциированных побочных эффектов (тошнота, абдоминальный дискомфорт, изменения вкуса).


Антибиотик-ассоциированная диарея в группах



PP – per protocol. ITT – intention to treat.

Различие между 1 и 2 группами PP и ITT клинически значимы при  $p < 0,05$ .

Нежелательные явления после антихеликобактерной терапии



НЯ – нежелательные явления. Другие НЯ – тошнота, абдоминальный дискомфорт, изменения вкуса. Суммарно НЯ – диарея + другие НЯ.

Различия между 1-й и 2-й группами статистически значимы ( $p < 0,05$ ).

Существенное снижение частоты нежелательных явлений при проведении антихеликобактерной терапии с помощью пробиотиков или пребиотиков отмечалось ранее в других исследованиях. Дополнительное назначение пробиотиков или пребиотиков рекомендовано IV Маастрихтским / Флорентийским соглашением в качестве одного из способов, улучшающих антихеликобактерную терапию\*\*.

\* Старостин Б.Д., Старостина Г.А. Флоролакт при проведении антихеликобактерного режима // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2013. – № 1. – С. 15–18.

\*\* Malfertheiner P. et al. Management of *Helicobacter pylori* infection – the Maastricht IV / Florence Consensus Report // Gut. – 2012. – Vol. 61, No. 5. – P. 646–664.

## Рекомендации и способ применения пребиотического комплекса «Флоролакт®»

Для профилактики нарушений деятельности кишечника и для восстановления микрофлоры толстой кишки (при дисбактериозе), для нормализации метаболизма взрослым и детям старше 14 лет:


- 5,0 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза в день во время еды в течение месяца.  
При необходимости прием можно повторить.

Для нормализации стула при запоре взрослым и детям старше 14 лет:

- Начальная доза: 5,0–10,0 г Флоролакта (1–2 пакетика-саше) в день, при необходимости возможно увеличение дозы до 15,0–20,0 г (3–4 пакетика-саше) в день до нормализации стула
- Далее – переход на пребиотическую дозу: 5,0 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза в день в течение месяца

Разовую дозу – 5,0 г порошка (содержимое одного пакетика-саше) перед употреблением необходимо растворить в 50–100 мл воды комнатной температуры. Длительность приема не менее 30 дней.

БАД, не является лекарством.



ООО «Аванетик»  
197110, Санкт-Петербург  
ул. Пионерская, д. 30  
лит. Б, офис 107  
тел.: +7 (812) 956-72-70  
e-mail: info@florolact.ru  
www.florolact.ru