

Флоролакт®

Пребиотический комплекс

Режимы терапии и способ применения


Для профилактики нарушений деятельности кишечника и для восстановления микрофлоры толстой кишки (**при дисбактериозе**), для нормализации метаболизма:

- 5 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза в день в течение месяца

Для нормализации стула **при запоре**:

- Начальная доза: 5–10 г Флоролакта (1–2 пакетика-саше) в день, при необходимости возможно увеличение дозы до 15–20 г (3–4 пакетика-саше) в день до нормализации стула
- Далее – переход на пребиотическую дозу: 5 г Флоролакта (1 пакетик-саше) 1–2 раза в день в течение месяца

Разовую дозу – 5 г порошка (содержимое одного пакетика-саше) растворить в 50–100 мл воды (хорошо растворяется даже в прохладной воде).



Флоролакт®
Пребиотический комплекс

Для нормализации
деятельности кишечника
и коррекции дисбактериоза
желудочно-кишечного тракта



ООО «Аванетик»
197110, Санкт-Петербург
ул. Большая Зеленина, д. 8,
корп. 2, лит. А, офис 17

- +7 (812) 956-72-70
- info@avanetik.ru
- www.florolact.ru

Флоролакт®

Пребиотический комплекс

Флоролакт® – идеальная композиция ди-, олиго- и полисахаридов с пребиотическими свойствами


- Флоролакт® – пребиотический комплекс из трех типов растворимых пищевых волокон для сбалансированного и комплексного действия на протяжении всей толстой кишки
- Идеальное сочетание ди-, олиго- и полисахаридов с разной длиной цепи:
 - Лактитол (дисахарид)
 - Фруктоолигосахариды (с короткой цепью)
 - Полисахариды из акации (с большим молекулярным весом)
- Флоролакт оказывает синергическое воздействие на микрофлору кишечника: усиление пребиотического действия, то есть эффективность сочетанного действия препарата выше суммы эффективности отдельных компонентов
- В результате достигаются меньшее число побочных эффектов и лучшая переносимость
- Флоролакт оказывает оптимальное и эффективное действие на протяжении всей толстой кишки:
 - Лактитол быстро расщепляется в проксимальных отделах восходящей ободочной кишки
 - Олигосахариды быстро ферментируются и используются в основном в восходящей ободочной и частично в поперечной ободочной кишке
 - Полисахариды из акации расщепляются медленнее и используются далее в поперечной ободочной и нисходящей ободочной кишке

Фруктоолигосахариды

инулина

Лактитол

Гуммиарабик



Флоролакт®

Пребиотический комплекс

Синергическое пребиотическое действие: повышение эффективности и одновременное улучшение переносимости


- Комбинация фруктоолигосахаридов (ФОС) с гуммиарабиком обладает более выраженным, синергическим пребиотическим эффектом по сравнению с отдельным применением фруктоолигосахаридов или гуммиарабика

Влияние ФОС, гуммиарабика и ФОС + гуммиарабик на количество бифидобактерий (в log КОЕ)

Группа	Контроль	Через одну неделю	Увеличение количества бифидобактерий
ФОС	8,71	9,00	0,29
Гуммиарабик	7,71	8,38	0,67
ФОС + гуммиарабик	8,02	9,40	1,38

- Сочетанное применение фруктоолигосахаридов с гуммиарабиком достоверно улучшает переносимость фруктоолигосахаридов*

Выраженность абдоминальных симптомов (метеоризм, вздутие живота, дискомфорт) после одной недели применения (в %% по интегральной шкале)



- Двойное слепое рандомизированное исследование*
- 96 здоровых добровольцев
- Три группы: фруктоолигосахариды (ФОС) (6 г/сут), гуммиарабик (6 г/сут) и ФОС + гуммиарабик (3 г + 3 г /сут)

* Rochat F., Baumgartner M., Jann A., Rochat C., Nielsen G., Reuteler G. and Ballèvre O. Synergistic effect of prebiotics on human intestinal microflora. 2001.

Флоролакт®

Пребиотический комплекс

Действующие вещества и их эффекты

Действующее вещество	Основные эффекты	Основные синтезируемые КЦЖК
Лактитол	• Пребиотический • Осмотический • Гипоаммониемический	• Ацетат • Бутират
Фруктоолигосахариды (ФОС)	• Пребиотический • Нормализация моторики • Гипохолестеринемический • Гипогликемический	• Ацетат • Пропионат • Бутират
Гуммиарабик	• Пребиотический • Нормализация моторики • Гипохолестеринемический • Гипогликемический	• Пропионат • Бутират

- Повышение эффективности за счет синергического действия пребиотиков с разной длиной цепи: максимальная эффективность при минимальных побочных эффектах
- Флоролакт® оказывает комплексное действие на протяжении всей толстой кишки – не только в проксимальных, но и в дистальных ее отделах

Состав и область применения

Состав:

- Флорация (гуммиарабик, ФОС инулина) – 3,33 г
- Лактитол (лактит МС) – 1,67 г

Область применения:

- В качестве дополнительного источника растворимых пищевых волокон и лактитола
- В качестве пребиотика комплексного действия для восстановления микрофлоры и нормализации моторики кишечника

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью
- Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом
- Не содержит лактозу, казеин и глютен

Свидетельство о государственной регистрации:

- № RU.77.99.11.003.E.029440.07.11 от 15.07.2011 г.